


LA BOUBLE À CHANTELLE – STATION 27



Localisation		
Lieu-dit	Moulin Couvier	
Coordonnées	X (L93)	710 737
	Y (L93)	6 571 181
Caractéristiques		
Catégorie piscicole	2ème	
Date d'inventaire	29/09/2021	
Type d'inventaire	Partielle à pied	
Longueur (m)	325	
Largeur (m)	14,3	
Profondeur moyenne (m)	0,49	
Faciès (%)	Courant	20
	Plat	50
	Profond	30
Granulométrie	Dominante	Sables
	Accessoire	Pierres
Distance à la source (km)	53,0	
Altitude (m)	290	
Pente (‰)	3,0	

Paramètres physico-chimiques					
Temp. (°C)	Cond. (µs/cm)	pH	Oxygène (mg O2/l)	Nitrates (mg NO3-/l)	Phosphates (mg PO43-/l)
14,1	233	7,2	10,8	15,0	0,20

Indices stationnels					
NTT		IPR		Densité (TRF/ha)	Qualité salmonicole
5,7	B5+	9,6	BON	21	TRES FAIBLE

Données brutes		Données estimées		
Espèces	Effectifs (ind.)		Effectifs (ind.)	Densités numériques et relatives ind./ha
	1er passage	2nd passage		
SPI	16		16	171
GAR	11		11	117
CHE	35		35	373
PSR	3		3	32
CCO	1		1	11
VAI	221		221	2356
GOU	157		157	1674
ABL	5		5	53
PFL	2		2	21
LOF	89		89	949
TRF	2		2	21
BAF	1		1	11
CHA	2		2	21
TOTAL	545	0	545	5810
Nombre d'espèces piscicoles		12		
Nombre d'espèces astacicoles		1		





Cet inventaire fait suite à deux années de sécheresse estivale qui se sont traduites par la rupture prolongée des écoulements de la Bouble dans ce secteur. Les conditions hydrologiques de 2021 ont été nettement moins contraignantes et l'inventaire a pu se dérouler dans des conditions de capture acceptables, caractérisées par un débit relativement soutenu pour la saison et une légère turbidité des eaux. Ces conditions nous ont conduit à retenir la « pêche partielle par points » comme méthode d'inventaire, alors que des pêches « complètes à deux anodes » étaient mises en œuvre jusqu'à présent. Pour ces raisons, les densités de population présentées ci-dessus sont possiblement sous-estimées.

D'un point de vue qualitatif, et comparativement à l'inventaire précédent (octobre 2019), le peuplement capturé s'est enrichi de la truite fario, de la carpe commune et du gardon. Toutes les espèces attendues avec de fortes probabilités de présences théoriques (PPT) par le modèle I.P.R. ont été capturées.

Des espèces patrimoniales et/ou protégées sont présentes en faibles densités (truite fario, chabot), ainsi qu'une espèce exotique envahissante, le pseudorasbora. A l'exception de la carpe commune (PPT = 0,16), les autres espèces capturées possèdent des PPT « moyennes », comprises entre 0,35 et 0,65. Qualitativement le peuplement présente donc un faible niveau de distorsion par rapport à l'attendu en situation de référence. On remarquera simplement sa faible robustesse, caractérisée par la présence de plusieurs espèces très peu représentées parmi les espèces attendues avec des PPT moyennes à fortes (chabot, ablette, truite fario et barbeau fuyatile).

Du point de vue quantitatif, une évolution à la hausse des densités est constatée par rapport à l'inventaire précédent, notamment vis-à-vis des vairons (densité jugée « assez faible », en hausse de 340% par rapport à 2019), des goujons (densité « moyenne », + 300%), des loches franches (densité « faible », + 740%) et des chevesnes (densité « assez faible », + 340%). La densité totale d'individus vaut environ 5 800 ind./ha, soit une valeur légèrement inférieure à celle mesurée avant les sécheresses de 2019 et 2020 (7 000 ind./ha en 2017). Ces résultats illustrent les capacités de résilience des milieux aquatiques après des épisodes hydrologiques exceptionnels.



En réponse à l'amélioration qualitative et quantitative du peuplement par rapport à l'inventaire précédent, l'I.P.R. s'améliore nettement en perdant douze points d'indice. Il s'établit à un niveau voisin de celui observé sur la période 2011-2017, et permet à la Bouble, après 2019, de revenir à une classe de qualité jugée **BONNE**. L'obtention d'une meilleure classe de qualité est principalement limitée 1/ par l'absence d'espèces rhéophiles attendues avec des PPT moyennes par le modèle I.P.R. (vandoise et hotu), et 2/ par une densité excessive d'espèces omnivores (principalement le chevesne) par rapport à la densité attendue en situation de référence.

Après un inventaire 2019 marqué par l'absence de truite fario au droit de ce secteur historiquement colonisé et situé à l'aval proche des parcours classés en 1ère catégorie, l'inventaire 2021 a permis la capture d'une truitelle de 80 mm et d'un géniteur de 315 mm. La densité salmonicole demeure **TRES FAIBLE**, voisine de la valeur mesurée en 2017. Outre les conditions hydrologiques et climatiques particulièrement contraignantes des années 2019/2020, la population de truite fario a été pénalisée en 2021 par les débits hivernaux importants et par le coup d'eau de la fin juin qui ont probablement dégradé le recrutement en truitelles.



Truitelle née durant l'hiver 2020/2021



Géniteur probablement natif de la Bouble